

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée -

- 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)

ABONNEMENT ANNUEL

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne

C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

-- BULLETIN TECHNIQUE N° 193 (14ème envoi de 1981) --

29 juin 1981

/ ARBRES A FRUITS A NOYAU /TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER

Le deuxième vol se poursuit et le climat actuel est très favorable à l'activité de ce ravageur.

a) Protection des pousses (pépinières, vergers en formation) : appliquer un nouveau traitement avec l'un des produits cités dans le bulletin précédent.

b) Protection des pêches :

1 - Variétés à récolter à partir du 10 juillet : traiter du 1er au 3 juillet compris avec un produit à base soit de mévinphos (à 50 g de m.a./hl) soit de dichlorvos (à 125 g de m.a./hl).

2 - Variétés à récolter entre le 18 juillet et le 18 août : traiter dès réception avec l'un des produits cités dans le bulletin du 16 juin 1981.

CARPOCAPSE DES PRUNES

Le deuxième vol est en cours et des oeufs ont été déposés depuis quelques jours. Effectuer, dans les plantations habituellement sensibles aux attaques de ce ravageur, un traitement dès à présent.

/ V I G N E /MILDIOU

La situation est très saine dans l'ensemble du vignoble et la sécheresse qui a duré trois semaines a stabilisé l'invasion dans les foyers alors que la période de plus grande sensibilité des grappes est maintenant dépassée.

Cependant, dans les parcelles où l'on a constaté la présence de quelques taches, il est prudent d'effectuer un nouveau traitement.

BLACK-ROT

Dans certaines vignes du Tarn (LAGRAVE), du Gers (NOGARO, PANJAS), du Lot (LUZÉCH, COURNOU, PRADINES), de nombreuses taches sont apparues vers le milieu du mois de juin. Dans ces parcelles, il y a lieu de craindre de graves attaques sur grappes à l'occasion des chutes de pluie. Il est donc nécessaire d'y maintenir une protection continue en fonction du rythme des pluies.

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Eudémis - Cochylis)

Le deuxième vol commence mais il est actuellement trop tôt pour intervenir. Attendre les indications d'un prochain bulletin.

P...259

/ CULTURES LEGUMIERES /MELON

La récolte est commencée dans les cultures les plus précoces et l'on déplore, malgré la sécheresse du début du mois, des cas de pourriture de fruits. On est désarmé et le seul conseil que l'on puisse donner est de ramasser soigneusement ces fruits et de les transporter hors de la parcelle afin d'éviter de contaminer les autres fruits. Cette précaution, si on la met en pratique dès les premiers cas, s'avère efficace.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription Phytosanitaire "MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU.-

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : J. THIAULT.-

C.P.P.A.P. - N° 532 A.D.